

Type specimens of the Myrtaceae in the Herbarium of the Martin-Luther-University, Halle/Saale (HAL)

U. Braun

Original published in: *Schlechtendalia* 5: 1-10, 2000.

- Abbevillea schlechtendaliana* O. Berg, *Linnaea* 27: 426 "1854" (1856) nom. nud., in Mart., *Fl. Bras.* 14(1): 433 (1857); Typus: "Brasilia: prov. Bahia, B. Luschnath, 1831-1837", HAL 53120.
- Amomis acris* (var.) *obtusata* O. Berg, *Linnaea* 27: 419 "1854" (1856); Syntypus: "F.W. Sieber, *Fl. Trinitatis*, No.102, Insel Trinidad, F. Wrbna, 1822", HAL 89779.
- Amomis pimento* (var.) *surinamensis* O. Berg, *Linnaea* 27: 419 "1854" (1856); Typus: "Surinam (in horti cult.)", HAL 49063.
- Aulomyrcia alloiota* O. Berg, (a. *cuneata*), in Mart., *Fl. Bras.* 14(1): 54 (1857); Syntypus: "Brasilia, Martii, *Herb. Flor. Brasil.*, No.1231", HAL 89793.
- Aulomyrcia bahiensis* O. Berg, in Mart., *Fl. Bras.* 14(1): 113 (1857); Holotypus: "Brasilia, Bahia, B. Luschnath, 1831-1837", HAL 89794.
- Aulomyrcia blanchetiana* O. Berg, in Mart., *Fl. Bras.* 14(1): 65 (1857); Syntypus: "Brasilia, Bahia, J.S. Blanchet 3391, 1828-1856", HAL 89798.
- Aulomyrcia botrys* O. Berg, in Mart., *Fl. Bras.* 14(1): 116 (1857); Holotypus: "Brasilia, H.W. Buek", HAL 89799.
- Aulomyrcia bullata* O. Berg, in Mart., *Fl. Bras.* 14(1): 96 (1857); Syntypus: "Brasilia, Bahia, B. Luschnath 110, 1831-1837", HAL 89800.
- Aulomyrcia chilensis* O. Berg, *Linnaea* 27: 38 (1855); Typus: "Chile, E.F. Poeppig, No.138 (1652 B), 1827-1829", HAL 89690.
- Aulomyrcia lancea* O. Berg, in Mart., *Fl. Bras.* 14(1): 88 (1857); Syntypus: "Brasilia, Bahia, Jacobine, J.S. Blanchet 2786, 1828-1856", HAL 89698.
- Aulomyrcia masoni* O. Berg, in Mart., *Fl. Bras.* 14(1): 121 (1857); Syntypus: "Brasilia, Matto Grosso, J. Lhotsky 46, 1830-1832", HAL 89700.
- Aulomyrcia ramulosa* (DC.) O. Berg (var.) *subcordata* O. Berg, in Mart., *Fl. Bras.* 14(1): 62 (1857); Syntypus: "Brasilia, Rio de Janeiro, Gomes", HAL 89710.
- Aulomyrcia rosulans* O. Berg, *Linnaea* 27: 54 (1854); Syntypus: "Brasilia, Bahia, Jacobine, J.S. Blanchet 3369, 1828-1856", HAL 89777.
- Aulomyrcia sphenoides* O. Berg, in Mart., *Fl. Bras.* 14(1): 63 (1857); Syntypus: "Brasilia, Bahia, J.S. Blanchet 1825, 1828-1856", HAL 89718.
- Aulomyrcia subverticillaris* O. Berg (var.) *angustifolia* O. Berg, in Martius (1857); Typus: "Brasilia, Minas Geraes, Martii, *Herb. Fl. Brasil*, No.1232", HAL 89803.
- Aulomyrcia supraaxillaris* O. Berg, in Mart., *Fl. Bras.* 14(1): 69 (1857); Syntypus: "Brasilia, Bahia, Jacobine, J.S. Blanchet 3368, 1828-1856, HAL 89804.
- Aulomyrcia tenuifolia* O. Berg, in Mart., *Fl. Bras.* 14(1): 68 (1857); Holotypus: "Brasilia, Bahia, J.S. Blanchet 2321, 1828-1856, HAL 89806.
- Baeckea carnosula* Sieber, in Spreng., *Syst. Veg.* 4(2): 149 (1827); (= *B. brevifolia* DC.); Syntypus: "Fl. Novae Holl. No. 278, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII.1823", HAL 89662.
- Baeckea diffusa* Sieber ex DC., *Prodr.* 3: 230 (1828); Syntypus: "Fl. Novae Holl. No. 276, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII.1823", HAL 89661.
- Baeckea diosmoides* Sieber ex DC., *Prodr.* 3: 230 (1828); (= *B. crenulata* DC.); Syntypus: "Fl. Novae Holl. No.277, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII.1823", HAL 89660.
- Baeckea ericoides* Schldtl., *Bot. Ztg.* 4: 724 (1846); Typus: "Sumatra litus, F. Junghuhn", HAL 072108.

- Baeckea fasciculata* Sieber, in Spreng., Syst. Veg. 4(2): 149 (1827); (= *B. densifolia* Sm.); Syntypus: "Fl. Novae Holl. No. 279, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89659.
- Baeckea microphylla* Sieber, in Spreng., Syst. Veg. 4(2): 149 (1827); Syntypus: "Fl. Novae Holl. No. 282, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89658.
- Calycothrix behriana* Schltld., Linnaea 20: 650 (1847); Typus: "Australien: Auf kalkig-sandigem Boden (Sandplaine) bei Bethanien, H. Behr, XI.", HAL 48919.
- Calycothrix scabra* DC. var. *minor* Schltld., Linnaea 20: 650 (1847); Holotypus: "Australien: Im Pine forest-Wald zwischen dem Gawler und Lightriver, H. Behr", HAL 48918.
- Calyptranthes fastigiata* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 50 (1857); Syntypus: "Brasilia, Rio de Janeiro, Martii, Herb. Fl. Brasil., No.1237", HAL 89620.
- Calyptranthes multiflora* Poepp. ex O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 42 (1857); Syntypus: "Brasilia, Teffé, prov. Solimoes, E.F. Poeppig 2684, 1831/32", HAL 89621.
- Calyptranthes schiedeana* O. Berg, Linnaea 27: 28 (1855); Holotypus: "Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, VIII. 1829", HAL 89752.
- Calyptranthes schlechtendaliana* O. Berg, Linnaea 27: 29 (1855); Holotypus: "Mexico: In sylvis Papantlae, C.J.W. Schiede, Nr.25, XII.1828", HAL 89749 (2 Bögen).
- Camphomyrtus behrii* Schltld., Linnaea 20: 651 (1847); Holotypus: "Australien: Auf kalkig-sandigem Boden (Sandplaine) bei Bethanien, H. Behr, 10.I.1845, HAL 074924.
- Campomanesia suffruticosa* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 448 (1857); Syntypus: "Brazil, Piauhy, Goyaz & C.G. Gardner, 1837-1841", HAL 89778.
- Campomanesia synchrona* O. Berg, in Mart., Fl. Bras.14(1): 444 (1857); Syntypus: "Brasilia, Bahia, Jacobine, J.S. Blanchet 3367, 1828-1856", HAL 89776.
- Eucalyptus acervula* Sieber ex DC., Prodr. 3: 217 (1828); (= *E. eugenioides* Sieber ex Spreng.); Isotypus: "Fl. Novae Holl. No. 469, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII.1823, HAL 89683.
- Eucalyptus eugenioides* Sieber ex Spreng., Syst. Veg. 4(2):193 (1827); Isotypus: "Australia, N.S.W., Nova Hollandia 479, F.W. Sieber, VI.-XII.1823", HAL 89681.
- Eucalyptus fabrorum* Schltld., Linnaea 20: 656 (1847); (= *E. obliqua* L'Her.); Holotypus: "Südaustralien: Montes Barossae, H. Behr, 1844/45", HAL 89676.
- Eucalyptus gracilis* Sieber, in Benth., Fl. Austral. 3: 222 (1866), non *E. gracilis* F. Muell.1855, nom. illeg., pro syn. *E. crebra* F. Muell.; Typus: "Fl. Novae Holl. No. 476, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89679.
- Eucalyptus granularis* Sieber, in Benth., Fl. Austral. 3: 222 (1866), nom. illeg., pro syn. *E. viminalis* Labill.; Syntypus: "Fl. Novae Holl. No. 474, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII.1823", HAL 89680.
- Eucalyptus incrassata* Labill., Nov. Holl. Pl. 2: 2 (1806); Isotypus: "Australia, Labillardiere, ex herb. Willdenow", HAL 89678.
- Eucalyptus incrassata* Sieber ex DC., Prodr. 3: 217 (1828), nom.illeg., non Labill.1806; Isotypus: "Fl. Novae Holl. No.477, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII.1823", HAL 89653.
- Eucalyptus ligustrina* DC., Prodr. 3: 219 (1828); Isotypus: "Fl. Novae Holl. No. 617, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89657.
- Eucalyptus micrantha* DC., Prodr. 3: 217 (1828); (= *E. racemosa* Cav.); Isotypus: "Fl. Novae Holl. No. 497, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII.1823", HAL 89656.
- Eucalyptus oblonga* DC., Prodr. 3: 217 (1828); Isotypus: "Fl. Novae Holl. No.583, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89655.
- Eucalyptus obtusiflora* DC., Prodr. 3: 220 (1828); (= *E. rigida* Sieber, Fl. Novae Holl. No. 473, non *E. rigida* Hoffsgg.1826); Isotypus: "Fl. Novae Holl. No.473, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII.1823", HAL 89649.
- Eucalyptus odorata* Behr in Schltld., Linnaea 20: 657 (1847); Typus: "Südaustralien, Aldenhoven Estata, H. Behr, März 14", HAL 17754.
- Eucalyptus pallens* DC., Prodr. 3: 219 (1828); (= *E. obliqua* L'Her.); Isotypus: "Fl. Novae Holl. No.606, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89654.
- Eucalyptus pauciflora* Sieber, in Spreng., Syst. Veg. 4(2): 195 (1827); Syntypus: "Fl. Novae Holl. No.470, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 98677.
- Eucalyptus punctata* DC., Prodr. 3: 217 (1828); Isotypus: "Fl. Novae Holl. No. 623, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89652.
- Eucalyptus radiata* Sieber ex DC., Prodr. 3: 218 (1828); Isotypus:"Fl. Novae Holl. No. 475, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89651.

- Eucalyptus rostrata* Schldtl., Linnaea 20: 655 (1847), nom. illeg. (non *E. rostrata* Cav. 1797); Holotypus: "Südaustralien, Montibus Barossae, H. Behr, März 16", HAL 89675.
- Eucalyptus stellulata* Sieber ex DC., Prodr. 3: 217 (1828); Isotypus: "Fl. Novae Holl. No. 478, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89648.
- Eucalyptus stricta* Sieber ex Spreng., Syst. Veg. 4(2): 195 (1827); Isotypus: "Fl. Novae Holl. No. 472, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89647.
- Eucalyptus terminalis* Sieber, in Benth., Fl. Austral. 3: 211 (1866), nom. inval., pro syn. *E. paniculata*; Syntypus: "Fl. Novae Holl. No. 468, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89674.
- Eucalyptus virgata* Sieber ex DC., Prodr. 3: 217 (1828); Syntypus: "Fl. Novae Holl. No. 476, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89646.
- Eugenia amazonica* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 322 (1857); Syntypus: "Brasilia, prov. Solimoes, E.F. Poeppig 2864, 1831-32", HAL 060214.
- Eugenia buxifolia* Willd. var. *parvifolia* Schldtl., Linnaea 5: 199 (1830); Typi: St. Thomas, C. Ehrenberg, 1826-1828, HAL 064824 und 064825.
- Eugenia cassinoides* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 286 (1857); Holotypus: "Brasilia, Bahia, P. Salzmann, 1827-1830", HAL 89626.
- Eugenia cauliflora* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 268 (1857); Syntypi: "Brasilia, Bahia, P. Salzmann, 1827-1830", HAL 89627, HAL 89628.
- Eugenia chrysantha* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 272 (1857); Holotypus: "Brasilia, Matto Grosso, J. Lhotsky 63, 1830-1832", HAL 060213.
- Eugenia corralensis* Phil., Linnaea 33: 72 (1865); Typus: "Chile, Corral, R.A. Philippi, 1851", HAL 89634.
- Eugenia diantha* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 239 (1857); Syntypus: "Brasilia, prov. Bahia, Jacobine, J.S. Blanchet 2862, 1828-1853", HAL 060212.
- Eugenia dictyophleba* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 226 (1857); Syntypus: "Brasilia, prov. Bahia, Jacobine, S. Blanchet, 1828-1853", HAL 060211.
- Eugenia distoma* O. Berg, Linnaea 27: 155 (1856)
(= *Myrtus phlebophylla* Kunze in Poepp., in herb.)
Syntypus: "Pöppig, Coll. pl. Chil. II., 77 (78), Chile: In sylvis ad Talcahuano, E.F. Poeppig 456, 1827-1829", HAL 89616.
- Eugenia divaricata* O. Berg, Linnaea 27: 257 (1856); (= *Myrtus divaricata* Poepp., in herb.); Syntypus: "Pöppig, Coll. pl. Chil. III., 136, In Chil. austr. praeruptis ad Antuco, E.F. Poeppig 897, 1827-1829", HAL 89612.
- Eugenia ehrenbergii* O. Berg, Linnaea 27: 153 (1854); Syntypus: "S. Domingo, C. Ehrenberg, 1828-1831", HAL 064827.
- Eugenia floribunda* West ex Willd., Sp. Pl. 2: 960 (1799); Typus: "Ins. S. Croix, ex herb. Willdenow", HAL 89630.
- Eugenia foetida* Pers. var. *parvifolia* O. Berg, Linnaea 27: 212 (1856); Syntypus: "S. Domingo, C. Ehrenberg, 1828-1831", HAL 063400.
- Eugenia glomerata* Spring ex Mart., Flora 20 (Beibl. II): 82 (1837); Typus: "Martii, Herb. Flor. Bras. No. 43, Brasilia, Corcovado", HAL 89641.
- Eugenia hoffmannseggii* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 315 (1857); a. (var.) *grandifolia*; Syntypus: "Brasilia, F.W. Sieber pro C. de Hoffmannsegg, 1801-1807, ex herb. Willdenow", HAL 079361.
- Eugenia laevis* O. Berg, Linnaea 27: 177 (1854); Typus: "St. Domingo, C. Ehrenberg", HAL 81699.
- Eugenia lancea* Poir., Encycl. méth., Suppl. III: 123 (1813); Syntypus: "St. Thomas, C. Ehrenberg, 1826-1828", HAL 063567.
- Eugenia lateriflora* Willd., Sp. Pl. II: 749 (1799); Typus: "Ins. S. Crucis, ex herb. Willdenow", HAL 89625.
- Eugenia lugens* O. Berg, Linnaea 27: 299 (1856); Typus: "E.F. Poeppig (No. 136, Myrtacea.)", HAL 89639.
- Eugenia macrocarpa* Schldtl. et Cham., Linnaea 5: 560 (1830); cf. Schldtl., Linnaea 13: 417 (1839); Syntypi: Mexico, in sylvis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, VIII. 1828, HAL 81698 (3 Bögen).
- Eugenia maculata* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 297 (1857); Syntypus: "Brasilien, Maynas, E.F. Poeppig 2409, 1831/32", HAL 060210.
- Eugenia micropetala* Mart., Flora 24 (Beibl. II): 108 (1841); Typi: "Brasilia, Bahia, Ilhenos, B. Luschnath 116, 1831-1837, (Mart., Herb. Fl. Bras. 685)", HAL 89748 (2 Bögen), HAL 82957 (2 Bögen).

- Eugenia nutans* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14 (1): 299 (1857); Syntypus: "Martii, Herb. Fl. Brasil. No. 1228(?)", HAL 89783.
- Eugenia platyphylla* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 294 (1857); Syntypi: "Brasilien, Bahia, B. Luschnath 115, 1831-1837", HAL 89812 (3 Bögen).
- Eugenia reticularis* O. Berg, Linnaea 27: 170 (1856); Typus: "S. Domingo, C. Ehrenberg 412, 1828-1831", HAL 063399.
- Eugenia rosmarinifolia* Poir. a.(var.) *angustissima* O. Berg (1857); Syntypi: "S.Domingo, C. Ehrenberg, 1828-1831", HAL 063395, HAL 063396, HAL 063397.
- Eugenia salicifolia* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 312 (1857); Syntypus: "Martii, Herb. Fl. Brasil. No.1226, Brasilia, Cujuba, HAL 063398.
- Eugenia schiedeana* Schldtl., Linnaea 13: 418 (1839); Syntypi: "Mexico, prope Jalapam, Aug.; inter Veracruz et Santa Fè, Jul., C.A.W. Schiede", HAL 81700 und 079363.
- Eugenia sieberiana* DC., Prodr. 3: 277 (1828); Syntypus: "F.W. Sieber, Fl. Triniatis No.222, Trinidad, F.Wrbna, 1822", HAL 063394.
- Eugenia tierneyana* F. Muell., Fragm. 4: 14 (1863-64); Typus: "Australia, Rockingham Bay, F. v. Mueller", HAL 89632.
- Eugenia trichocarpa* Phil., Linnaea 28: 688 (1856); Typus: "Chile, Corral, R.A. Philippi, 1851", HAL 89617.
- Eugenia trinitatis* DC., Prodr. 3: 280 (1828); (°*Myrtus dioica* Sieber, nom.nud.); Syntypus: "Fl. Trinitatis No. 94, Ins. Trinidad, F. Wrbna, 1822", HAL 060209.
- Eugenia vernicosa* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 274 (1857); Holotypus: "Brasilia, prov. Bahia, ex herb. H. Kegel, B. Luschnath, 1831-1840", HAL 060208.
- Eugenia wilsonii* F. Muell., Fragm. 5: 2 (1865-1866); Typus: "Australia, Rockingham Bay, F. v. Mueller", HAL 89631.
- Eugeniopsis acutissima* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 144 (1857); Holotypus: "Brasilia, Bahia, ex herb. H. Kegel, B. Luschnath, 1831-1840", HAL 89792.
- Eugeniopsis affinis* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 149 (1857); Holotypi: "Brasilia, Bahia, ex herb. H. Kegel, B. Luschnath, 1831-1840", HAL 89747 (2 Bögen).
- Eugeniopsis grandifolia* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 149 (1857); Holotypus: "Brasilia, Bahia, ex herb. H. Kegel, B. Luschnath, 1831-1840", HAL 89619.
- Gomidesia blanchetiana* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 14 (1857); Syntypus: "Brasilia, Bahia, J.S. Blanchet 3415, 1828-1856", HAL 89622.
- Gomidesia clauseniana* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 23 (1857); Syntypus: "Martii Herb. Flor. Brasil. No.1235, Brasilia, Minas Gerais", HAL 89751.
- Gomidesia fenzliana* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 20 (1857); Syntypus: "Martii, Herb. Flor. Brasil. No.683, Brasilia, Rio de Janeiro", HAL 89807.
- Gomidesia martiana* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 12 (1857); Syntypus: "Brasilia, Rio de Janeiro, F. Sellow, 1814-1831", HAL 89624.
- Jambosa cymifera* E. Mey., in Drège, Zwei Pfl. Docum. 194 (1844); Typus: "Südafrika, Port Natal, April", HAL 89637.
- Leptospermum eriocalyx* Sieber ex Spreng., Syst.Veg. 4(2): 194 (1827); (= *L. parvifolium* Sm.); Syntypus: "Fl. Novae Holl. No. 313, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89667.
- Leptospermum marginatum* Labill., Nov. Holl. Pl. 10 (1806); Syntypus: "e Terra van Leuwin, Labillardiere, ex herb. Willdenow", HAL 89665.
- Leptospermum myrsinoides* Schldtl., Linnaea 20: 653 (1847); Holotypus: "Südastralien, zwischen dem Gawler und Lightriver, H. Behr, Nov. 1844/45", HAL 89664.
- Leptospermum myrtifolium* Sieber ex DC., Prodr. 3: 228 (1828); Syntypus: "Fl. Novae Holl. No.314, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89668.
- Leptospermum pendulum* Sieber ex DC., Prodr. 3: 228 (1828); (= *L. attenuatum* Sm.); Syntypus: "Fl. Novae Holl. No.312, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89666.
- Leptospermum sericeum* Labill., Nov. Holl. Pl. II: 9 (1806); Syntypus: "Ins. van Diemen, Labillardiere, ex herb. Willenow", HAL 89669.
- Leptospermum squarrosum* Sieber, in Spreng., Syst. Veg. 4(2): 194 (1827); (= *L. scoparium* Forst.); Syntypus: "Fl. Novae Holl. No. 311, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89663.
- Marlierea strigipes* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 32 (1857); Syntypi: "Martii, Herb. Fl. Brasil. No. 686, Brasilia, Bahia, Luschnath 114, 1831-1837, HAL 89743 (2 Bögen).

- Melaleuca fascicularis* Labill., Nov. Holl. Pl. 2: 29 (1806); Syntypus: "Australien, e Nova Hollandia (ins. Van Diemen), Labillardiere, ex herb. Willdenow", HAL 89688.
- Melaleuca gibbosa* Labill., Nov. Holl. Pl. 2: 30 (1806), Syntypus: "Australien, e Nova Holl., Labillardiere, ex herb. Willdenow", HAL 89685.
- Melaleuca squamea* Labill., Nov. Holl. Pl. 2: 28 (1806), Syntypus: "Australien, e Nova Holl. (ins. Van Diemen), Labillardiere, ex herb. Willdenow", HAL 89684.
- Metrosideros albida* Sieber ex DC., Prodr. 3: 212 (1828), nom. inval., pro syn. *Melaleuca viridiflora*; Typus: "Fl. Novae Holl. No. 319, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89644.
- Metrosideros calyculatum* Sieber ex DC., Prodr. 3: 223 (1828), nom. inval., pro syn. *Callistemon lineare*; Typus: "Fl. Novae Holl. No. 545, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89645.
- Metrosideros chrysantha* F. Muell., Fragm. 4: 159 (1864), Syntypus: "Australia, Queensland, Rockingham Bay, F. v. Mueller", HAL 89672.
- Metrosideros stipularis* J.A. Hook., Fl. Antarct. 2: 275 (1846); Isotypus: "Chile, ex herb. Hooker. f.", HAL 89670.
- Myrceugenia chilensis* O. Berg, Linnaea 27: 132 (1856); Typus: "Pöppig, Coll. pl. Chil. II. 76 (76), Chile: In sylvis ad Talcuhuano, E.F. Poeppig, Apr. 1827-1829", HAL 89618.
- Myrcia bergiana* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 194 (1857); Syntypi: "Brasilia, Bahia, P. Salzmann, 1827-1830, HAL 89795; "Brasilia, Bahia, B. Luschnath, 1831-1837", HAL 89796.
- Myrcia caracasana* Klotzsch ex O. Berg, Linnaea 27: 92 (1855); Typus: "Venezuela, Caracas, H. Karsten 4", HAL 89801.
- Myrcia chilensis* O. Berg, Linnaea 27: 99 (1855); Typus: "Chile, E.F. Poeppig 138, 1652 B, 1827-1829, HAL 89690.
- Myrcia cujabensis* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 161 (1857); Syntypi: "Brasilien, Matto Grosso, J. Lhotsky II, No.96, 1830-1832", HAL 89691. "Brasilien, Matto Grosso, J. Lhotsky II, No.2, 1830-1832", HAL 89692.
- Myrcia dasyblasta* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 207 (1857); Syntypus: "Martii, Herb. Fl. Brasil. No. 1230, Cujaba", HAL 89781.
- Myrcia detergens* Miq., Linnaea 22: 795 (1848); Typus: "Brasilia, Bahia, J.S. Blanchet 3442, 1828-1856", HAL 89636.
- Myrcia elongata* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 159 (1857) (var.) *grandifolia* O. Berg; Holotypus: "Brasilia, S. de Org., J. Lhotsky, IX.1830-1832, Fl. Sebast. n. 180", HAL 47302.
- Myrcia fascicularis* O. Berg, Linnaea 27: 87 (1855); Typi: "Peru, Chile, E.F. Poeppig 141, 1652, 1827-1829", HAL 82956, 2 Bögen.
- Myrcia klotzschiana* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 169 (1857); Syntypus: "Brasilia, F. Sellow, 1831", HAL 89695.
- Myrcia lacerdaeana* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 193 (1857); Syntypus: "Martii Herb. Fl. Brasil. No. 1234, Brasilia, Bahia", HAL 89696.
- Myrcia luschnathiana* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 194 (1857)
Syntypus: "Brasilia, Bahia, B. Luschnath, 1831-1837", HAL 89623.
- Myrcia magnoliaefolia* DC. (var.) *parvifolia* O. Berg, Linnaea 8: 177 (1833); (*Tetracera laurifolia* apud Willd. in herb. n. 10350); Typus: "Brasilia, Parä, F.W. Sieber, Comte ab Hoffmannsegg servus", HAL 47311.
- Myrcia mansoniana* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 163 (1857); Syntypus: "Brasilia, Matto Grosso, J. Lhotsky, 1830-1832, HAL 89701.
- Myrcia micrantha* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 169 (1857); Syntypus: "Brasilia, Bahia, F. Sellow, 1814-1831", HAL 89702.
- Myrcia opaca* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 177 (1857); Syntypus: "Martii, Herb. Fl. Brasil. No. 1233", HAL 89705.
- Myrcia poeppigiana* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 157 (1857); Syntypus: "Brasilia, E.F. Poeppig 2577", HAL 89707.
- Myrcia reticulata* O. Berg, Linnaea 27: 101 (1855); Syntypus: "F.W. Sieber, Herb. Mart. Suppl. Nro.47, Martinique, F. Kohaut, IV. 1819-IX.1821", HAL 47305.
- Myrcia rufidula* Schtdl., Linnaea 13: 416 (1839); Holotypus: "Mexico, Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, VII. 1829", HAL 89813, 3 Bögen.
- Myrcia salzmannii* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 207 (1857); Syntypus: "Brasilia, Bahia, P. Salzmann, 1827-1830", HAL 89713.

- Myrcia schaueriana* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 163 (1857); Syntypus: "Brasilia, F. Sellow, 1827-1830", HAL 89715.
- Myrcia sericea* O. Berg, Linnaea 27: 114 (1855); Typus: "E.F. Poeppig 143, 1675", HAL 89716.
- Myrcia sororica* DC., Prodr. 3: 243 (1828); Syntypus: "F.W. Sieber, Fl. Trinitatis. No. 111, Ins. Trinidad, F. Wrbna, 1822", HAL 89717.
- Myrcia surinamensis* Miq., Linnaea 22: 170 (1848); Typus: "Surinam, Bergendaal, H. Focke, 1835-1850", HAL 89635.
- Myrciaria disticha* O. Berg, *β.* (var.) *bahiensis* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 367 (1857); Holotypus: "Brasilia, Bahia, B. Luschnath, 1831-1837, ex herb. H. Kegel", HAL 89629.
- Myrciaria splendens* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 371 (1857); (= *Myrtus verticillata* Salzm. in herb.); Syntypi: "Brasilia, Bahia, P. Salzmann, 1827-1830", HAL 89638; "Brasilia, prov. Bahia, in sabulosis aridis, P. Salzmann, 1827-1830", HAL 060207.
- Myrciaria trinitatis* O. Berg, Linnaea 27: 336 (1856); Holotypus: "F.W. Sieber, Fl. Trinitatis, No. 151, Ins. Trinidad, F. Wrbna, 1822", HAL 060206.
- Myrtus blanchetiana* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 418 (1857); Syntypus: "Brasilien, Bahia, J.S. Blanchet, 1828-1856", HAL 89780.
- Myrtus buxifolia* Swartz, Fl. Ind. Occ. 2(1): 898 (1798); (= *Eugenia buxifolia* (Swartz) Willd.); Syntypus: "Hispaniola, Swartz, n. 9523 (?), ex herb. Willdenow" HAL 063393.
- Myrtus (Eugenia?) capuli* Schltdl. et Cham., Linnaea 5: 561 (1830); [*Eugenia capuli* (var.) a. *micrantha* O. Berg, Linnaea 27: 239 (1856)]; Typus: "Mexico, in sylvis Papantlae, C.J.W. Schiede, I. 1829", HAL 079362.
- Myrtus krausei* Phil., Linnaea 28: 638 (1856); Typi: "Chile, Corral prope Valdivia, R.A. Philippi, 1851", HAL 89746, 2 Bögen.
- Myrtus limbosa* Ruiz ex O. Berg, Linnaea 27: 295 (1856); Syntypus: "Peru, L.H. Ruiz, ex herb. Berolinensi", HAL 89699.
- Myrtus meli* Phil., Linnaea 28: 638 (1856); Typus: "Chile, Valdivia, R.A. Philippi, 1851", HAL 89615.
- Myrtus microphylla* Humb. et Bonpl., Pl. aequinoct. 1: 19, t. 4 (1808); Typus: "ex Amer. Mer., A. v. Humboldt, 1799-1804, ex herb. Willdenow", HAL 89791.
- Myrtus repens* Phil., Bot. Ztg. 15: 400 (1857); Typus: "Chile, Corral prope Valdivia, R.A. Philippi, 1851", HAL 89643.
- Myrtus rusCIFolia* Willd., Sp.Pl. II: 970 (1799); Typus: "Ind. orient., Klein, ex herb. Willdenow", HAL 89712.
- Myrtus trunciflora* Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 561 (1830); Syntypi: "Mexico, inter Mesachica et Mapilque, Dec. 1828; Papantla, Jan. 1829, C.A.W. Schiede", HAL 81701/1+2 (2 Bögen).
- Myrtus valdiviana* Phil., Linnaea 28: 688 (1856); Typus: "Chile, Corral, R.A. Philippi, 1851", HAL 89614.
- Phyllocalyx luschnathianus* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 333 (1857); (*Eugenia luschnathiana* Klotzsch, in herb.); Syntypi: "Brasilia, Cruz de Casma, B. Luschnath 112, 25.11.1835", HAL 82955, 2 Bögen.
- Psidium persicifolium* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(2): 407 (1857); Syntypus: "Martii Herb. Fl. Brasil. No. 686, Brasilien, Bahia, Jacobine, J.S. Blanchet 2916, 1828-1856", HAL 89787.
- Psidium rhombeum* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 383 (1857); Syntypus: "Brasilien, Bahia, Jacobine, J.S. Blanchet 2815, 1828-1856, HAL 89786.
- Stenocalyx lucidus* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 337 (1857); Syntypus: "Brasilia, prov. St. Pauli, F. Sellow, 1814-1831", HAL 064826.
- Syzygium elegans* Miq. (n.sp.), in Hohenacker, Pl. Indiae or. (Terr. Canara.) 464, in herb.; Syntypus: "Prope Mercara, Febr. m.", HAL 89703.

Originalmaterial (mögliche Typen)/Original material (possible types)

- Aulomyrcia caracasana* O. Berg, Linnaea 27: 53 (1855)
Caracas (554), HAL 89704.
- Aulomyrcia ramulosa* (DC.) O. Berg (var.) *panicularis* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 63 (1857)
Brasilia, H. Buek, HAL 89709.
- Aulomyrcia ramulosa* (DC.) O. Berg, (var.) *panicularis* O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 63 (1857)
Brasilia, Franke, HAL 89708.

- Callistemon coccineus* F. Muell., *Fragm.* 1: 13 (1858-1859)
Südaustralien, F. v. Mueller, HAL 89673.
- Eucalyptus cordata* Labill., *Nov. Holl. Pl.* 2: 13 (1806)
Labillardiere, ex Herb. Willdenow, HAL 89682.
- Eugenia albida* Humb. et Bonpl., *Pl. aequinoct.* 2: 107, t. 113 (1809)
Ex Amer. meridionalis, Humboldt, ex herb. Willdenow, HAL 89640.
- Eugenia bracteata* Rich., *Act. Soc. Hist. Nat. Paris* 1: 110 (1792)
Richard, ex herb. Willdenow, HAL 89697.
- Eugenia hirsuta* Ruiz et Pav., *apud López, An. Inst. Bot. A.J. Cavan.* 15: 186 (1957)
[Fl. peruv. 4: t. 417]
Peruvia et Chili, L.H. Ruiz, ex herbario Lamberti, HAL 89694.
- Eugenia kunthiana* DC., *Prodr.* 3: 264 (1828)
Martii, Herb. Fl. Brasil. 1227, HAL 89782.
- Eugenia rugosa* Ruiz, in herb.
Peruvia et Chili, L.H. Ruiz, ex herbario Lamberti, HAL 89711.
- Eugenia strigipes* O. Berg, in *Mart., Fl. Bras.* 14(1): 263 (1857)
Ohne Originaletikett! (Brasilia, F. Sellow?), HAL 89750 (2 Bögen).
- Kunzea leptospermoides* F. Muell., *Nederl. Kruidk. Arch.* 4: 146 (1859)
Australien, Victoria, F.v. Mueller, HAL 89671.
- Melaleuca acuminata* F. Muell., *Fragm.* 1: 15 (1858-1859)
"Austral. felix", F. v. Mueller, HAL 89687.
- Melaleuca bracteata* F. Muell., *Fragm.* 1: 15 (1858-1859)
New South Wales, F. v. Mueller, HAL 89686.
- Myrcia piauhiensis* O. Berg, in *Mart., Fl. Bras.* 14(1): 196 (1857)
Brasilia, G. Gardner 2865, HAL 89706.
Anmerkung: Berg (l.c.) cited "Gardner 2886",
- Myricaria splendens* O. Berg, *nom. nud.* (in herb.)
Brasilia, Bahia, in *sabulosus aridis*, P. Salzmann, 1827-1830, HAL 060207.
- Myrtus discolor* HBK, *Nov. gen. sp.* 6: 134 (1823)
(*Eugenia peruviana* Willd, in herb.)
Peru, A. v. Humboldt, ex herb. Willdenow, HAL 89613.
- Myrtus tardiflora* Salzm., in herb.
(= *Myrcia* sp.), Brasilia, Bahia, P. Salzmann, 1827-1830, HAL 89805.
- Psidium emarginatum* Ruiz et Pav., *apud López, An. Inst. Bot. A.J. Cavan.* 15: 191 (1957)
[Fl. Peruv. 4: t. 419]
Peruvia et Chili, L.H. Ruiz, ex herb. Lamberti, HAL 89784.
- Psidium lanuginosum* Ruiz et Pav., *apud López, An. Inst. Bot. A.J. Cavan.* 15: 195 (1957)
[Fl. Peruv. 4: t. 421]
Peruvia et Chili, L.H. Ruiz, ex herb. Lamberti, HAL 89790.
- Psidium poeppigianum* O. Berg (in herb.),
No. 2605, HAL 89785.
- Psidium ruizianum* O. Berg, *Linnaea* 27: 365 (1856)
Peruvia, No. 142 (1716), E.F. Poeppig, HAL 89788.
- Syzygium tenuifolium* F. Muell., in herb.
Australia, Rockingham Bay, F. v. Mueller, HAL 89633.
- Thryptomene plicata* F. Muell., *Fragm.* 1: 11 (1858-1859)
"Austral. felix", F. v. Mueller, HAL 89689.
- Tristania salicifolia* Link ex Steud., *Nomencl. Bot., Ed. 2, Vol. 2:* 714 (1841), *nom.nud.* (pro syn.)
Australia, Nova Hollandia, (Fl. Novae Holl. 219, 220), F.W. Sieber, VI.-XII. 1823, HAL 89642.