

**Type specimens of the Bryophyta in the Herbarium of the Martin-Luther-University, Halle/Saale
(HAL)**

R. Stordeur

Original published: Schlechtendalia 7: 1-16 (2001)

Cryphaea decurrens C. Müll., Syn. Musc. 2: 172 (1851); Holotypus: Mexiko, C. Ehrenberg, 1831-39; HAL 50.

Cryphaea patens Hornsch. ex C. Müll., Linnaea 18: 679 (1845); Holotypus: Mexiko, C. Ehrenberg, 1831-39; HAL 49.

Dicranoweisia brevifolia Dix. & Herz., Feddes Repert., Beih. CVIII(1): 6 (1938); Holotypus: Afghanistan, nördl. Zentral-Nuristan, Brubruts, 2400 m ü. M., 19.Vi.1935, G. Kerstan [Deutsche Hindukusch-Expedition 1935]; HAL 42.

Erythrophyllum (Didymodon) microstomum Dix. (n. sp. ined.), Feddes Repert., Beih. CVIII(1): 8 (1938); Typus: Afghanistan, nördl. Zentral-Nuristan, Brubruts, 2400 m ü. M., 19.VI.1935, G. Kerstan [Deutsche Hindukusch-Expedition 1935]; HAL 43.

Jungermannia abyssinica Nees, in Steph., Sp. Hep. 2: 53 (1901) [sub *Solenostoma*]; Syntypus: In latere boreali montis Silke supra regionem arborum et fruticum ad rivulos et rupes umbrosas, 22.2.1840, Schimper iteri Abyssinicum, Sectio secunda, 1392; HAL 51.

Leskea (?) sublaevifolia Dix. & Herz., Feddes Repert., Beih. CVIII(1): 10 (1938); Holotypus: NW-Indien, West-Tschitral, Brumotul, Bumboret-Tal, 1900 m ü. M., 5.X.1935, G. Kerstan [Deutsche Hindukusch-Expedition 1935]; HAL 45.

Mielichoferia ecklonii Hornsch., Linnaea 15: 118 (1841); Typus: South Africa, Cape (C. b. spei), Fl. Cap. Nrb. 68, Zeyher; HAL 56.

Orthotrichum suburnigerum Herz. (n. sp. ad interim), Feddes Repert., Beih. CVIII(1): 9 (1938); Typus: NW-Indien, West-Tschitral, Brumotum, Bumboret-Tal, 5.X.1935, 1900 m. ü. M., G. Kerstan [Deutsche Hindukusch-Expedition 1935]; HAL 47.

Anmerkung (notes): Etikett vorhanden, Exemplar fehlt (label present, but specimen lacking).

Webera hamata Schmidt, Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Natursch. 1: 122-123 (1927); Typus: Deutschland, Freiburg i.B., 1925/26, Schmidt; HAL 48.